

Restauration scolaire**Éviction gérée par**

après vérification des menus sur la présence d'allergènes selon la réglementation INCO

Repas garanti sans allergènes par la restauration scolaire

Panier repas apporté par l'enfant

Repas scolaires non autorisés

Goûter

Avec éviction des allergènes

Apportés par l'enfant

Non autorisés

Autres aménagements

Activités (arts plastique, cuisine...) : Ne pas manipuler

- La trousse d'urgence doit toujours être accessible avec un double de ce document et suivre l'enfant en cas de déplacement scolaire :

Endroit où est déposée la trousse d'urgence (à l'école, à la cantine) :

La trousse d'urgence est portée par l'élève (Lycée)

- Vérifier la présence d'un téléphone qui fonctionne accessible
- En cas de changement d'enseignant, s'assurer que celui-ci est informé de la conduite à tenir en cas de réaction allergique alimentaire
- Les parents doivent fournir les médicaments, en vérifier la date de péremption et les renouveler dès qu'ils sont périmés.

Date :

Signatures

Parents	Médecin allergologue	Médecin de l'Éducation Nationale
Infirmière scolaire	Responsable établissement	Responsable de la restauration

PHOTOS

Projet d'Accueil Individualisé

UNE RÉACTION ALLERGIQUE !

VITE JE RÉAGIS !



NOM :

Prénom :

Né(e) le :

Établissement :

Je soussigné, représentant légal, demande pour mon enfant la mise en place d'un Projet d'Accueil Individualisé à partir de la prescription médicale et/ou du protocole d'intervention du Docteur

J'autorise que ce document soit porté à la connaissance des personnels en charge de mon enfant dans l'établissement d'accueil : crèche, école, cantine, temps périscolaire.

Signature du représentant légal :

Contacts téléphoniques :

Parents Domicile :

Père Portable : Travail :

Mère Portable : Travail :

Autre référent :

Médecin de l'Éducation Nationale :

NOM :
ALLERGIES :

Prénom :

TROUSSE D'URGENCE

1. Adrénaline :
2. Bronchodilatateur :
+ Chambre d'inhalation
3. Antihistaminique :
4. Divers:

EPIPEN



Enlever le capuchon bleu



Placer l'extrémité orange du stylo sur la face extérieure de la cuisse



Appuyer fermement la pointe orange dans la cuisse jusqu'à entendre un déclic et maintenez appuyé pendant 10 sec.



Puis massez la zone d'injection

JEXT



Enlever le bouchon jaune



Placer l'extrémité noire du stylo sur la face extérieure de la cuisse



Appuyer fermement jusqu'à entendre un déclic en tenant la cuisse et maintenez appuyé pendant 10 sec.



Puis massez la zone d'injection

ANAPEN

Code: 34-009



Enlever le capuchon noir protecteur de l'aiguille



Retirer le bouchon noir protecteur



Appuyer fermement le stylo sur la face extérieure de la cuisse



Puis appuyer sur le bouchon rouge de déclenchement et maintenez appuyé pendant 10 sec. Puis masser la zone d'injection

EMERADE



Enlever le capuchon protecteur de l'aiguille




Placer et appuyer le stylo contre la face externe de la cuisse. Maintenir le stylo contre la cuisse pendant environ 5 secondes



Masser légèrement le site d'injection

UNE REACTION ALLERGIQUE

J'EVALUE IMMEDIATEMENT LA GRAVITE DE LA REACTION



La REACTION est **GRAVE**
si 1 seul de ces signes parmi

- Ma voix change
- Je respire mal, je siffle, je tousse
- J'ai très mal au ventre, je vomis
- Mains, pieds, cuir chevelu me démangent
- Je me sens mal ou bizarre
- Je fais un malaise
- Autres signes :

Cela peut être encore plus grave
si plusieurs de ces signes sont associés

La REACTION est **MODEREE**

- Ma bouche pique, mes lèvres gonflent
- Mes yeux piquent, mon nez coule
- Des plaques rouges qui démangent
- J'ai un peu mal au ventre
- et j'ai envie de vomir
- Autres signes

**MAIS JE PARLE
et RESPIRE BIEN**

LES BONS REFLEXES

1. Allonger l'enfant ou le laisser ½ assis en cas de gêne respiratoire
2. Injecter dans la face antéro-externe de la cuisse
3. Puis appeler SAMU (15 ou 112)
4. Si gêne respiratoire : Inhaler avec la chambre d'inhalation
jusque 4 à 10 bouffées, à répéter selon la gêne après 10 à 15 minutes.

5. En attendant les secours, une 2° INJECTION de peut être faite si les symptômes persistent après 5 minutes ou plus.

LES BONS REFLEXES

- 1.
- 2.
3. Surveiller l'enfant jusqu'à disparition des symptômes
4. Prévenir les parents, contacter le médecin.

EN L'ABSENCE D'AMELIORATION
J'EVALUE DE NOUVEAU la GRAVITE DE LA REACTION